

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十八

詳校官太醫院恩糧孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱圻

謄錄監生臣趙廷麒

欽定四庫全書

普濟方卷二百七十八

明

周王朱橚撰

嬰孩一切癇門

驚癇

附論

夫小兒氣血微弱易為病若卒驚動傷亂精神心氣不定因驚而發為癇凡養小兒當須持護或見異類必當撫抱無令恐怖若初覺兒驚急保抱之其驚自止若忽因驚成癇宜按圖灸康以摩膏不可大下蓋以心氣不

足若下之則內愈虛手足抽掣者並不可持捉使氣血凝滯失其道耳○夫驚癇忤三候大抵略相似皆口面青黑嘔吐涎沫頭項直手足搖動但驚即發拳癇搐掇忤即掣癇驚則喉中涎響癇則口中涎出響忤則口吐青黃白沫驚則雙目視癇則口眼相引而目睛上搖忤則眼不正挿不可得而同也

方

歸魂散 治小兒驚癇忤手足癇頭項強直狀如角弓

蝎梢

一錢
半炒

蜈蚣

赤脚者
半條炙

水銀粉

腦麝

各一
字

花蛇肉

酒浸炙黃
色秤一錢

川烏頭

炙七
箇生

天南星

切碎
用生

薑汁浸一日
為末秤半錢

右為末每服嬰孩半字二三歲一字已上四五歲半
錢金銀薄荷湯調下量兒虛實加減

清心丸

治小兒驚癇潮搐精神昏慢痰涎流溢并虛

實煩躁頭疼惡心風眩不語嘔吐倦怠

牛黃

三錢

腦子

雄黃

各二
錢

麝香

一錢

川芎

茯苓 柴胡

桔梗 各四兩

蒲黃 芍藥 各二兩

犀角 鎊

白朮 黃芩 黑豆 炒

阿膠 炒各半兩

麥門冬 去心半兩

杏仁 去皮尖半兩

人參 神麴 炒各三錢

肉桂 去皮一分

羚羊角屑 一分

乾薑 炮一分

山藥 一兩

甘草 一兩半

金箔 三百片

右為末煉蜜丸雞頭大金箔為衣一九竹葉湯化下

蚱蟬煎 治小兒驚癇頻頻發動經久不瘥肌體瘦弱

蚱蟬 三枚微炙去翅足

麻黃 去根節

釣藤 各一分

柴胡

苗 去

白芍藥

犀角

屑

知母

沙參

去蘆頭

甘

草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁知膏各半兩

蛇蛻皮

五寸燒灰

生地黃汁

五分

石膏

子芩

蜜

龍齒

各一兩

右除薑汁地黃汁蜜杏仁牛黃外並細剉先以水二

盞煎至一盞去渣入竹瀝一小盞又煎五七沸內杏

仁蜜薑汁地黃汁慢火煎攪不停手約十餘沸放冷

於甕合中盛牛黃攪令勻每一合分為三服煮量兒

大小加減

烏蛇牛黃散

治小兒驚癇風癇手足瘈瘲口眼相引

烏蛇

項下七寸酒浸一宿
去皮骨炙秤一錢

青黛

研二錢

蝎梢

炒十

枚

牛黃

炒半錢

麝香

研一字

蓬

研

龍腦

研

水銀沙子

各半錢

金箔

銀箔

並研各十片

蛇黃

醋淬

三遍

天南星

用生薑一同搗
作餅子焙乾

墨

燒

半夏

用生薑同

搗作餅子
焙乾一錢

烏蛇尾

酒浸一宿去皮
骨炙秤一錢

右研為散每服半錢量兒大小加減金銀薄荷湯服

鎮心丸

治小兒驚癇百病鎮心氣

銀屑

十二銖

水銀

二十銖

牛黃

六銖

大黃

六分

茯

苓

三分

茯神

人參

遠志

防己

白欬

雄

黃

芎藭

各二分

紫石英

真珠

防葵

鐵精

各四分

右先以水銀和銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲兒如麻子大二丸隨兒大小增之一方無牛黃

延壽丹 治小兒驚癇及大人卒中惡風涎潮昏重口

眼喎斜四肢痠拽口禁不省大效

辰錦砂 膩粉 鐵焰粉 白附子 蛇黃

各二兩

用醋浸少時
以大火煨過

大附子

炮各九兩

天南星

洗生淨

羌

活巴豆

搗碎用新水浸逐日換水
七日後以紙裹壓出油用

牛藤

去苗酒浸

焙

蝎稍

各三兩

生金

生銀

各別研一分

麝香

真牛黃

各別研一分

右為細末以蜜丸粟米飲搜和為丸如雞頭大每中
惡風疹緩及五癰疾薄荷酒磨下一丸老兒半丸小
兒驚癇十歲已上一丸

石膏散

治小兒一歲至四歲壯熱大驚發癇

方見本門一切

類癇

牛黃酒

治少小驚癇經年小勞輒發

牛黃

鍾乳

研各八分

麻黃

去節

秦朮

人參

各八分

桂心

七分

龍角

白朮

甘草

當歸

細辛

各五分

分

杏仁

四分

蜀椒

蜚蠊

九枚炙

右切以絹袋中酒五升浸之隨時月數半合日三

治小兒驚癇客忤發動鎮心安神

麝香 當門子

一粒

丹砂

一塊大
小相似

右細研熟水灌之

鳩頭丸 治小兒驚癇發動經年不斷根源

鳩頭

炙焦
一枚

蜚蠊

去足
炙
七枚

桂皮

去粗皮
一分

芍藥

蛇蛻

炙
五寸

蚱蟬

去翅足
炙
十枚

白茯苓

去黑皮
一兩

分一方用
茯神半兩

露蜂房

炙半
兩

甘草

炙
剉

黃芩

去黑
心

當歸

焙切

芍藥

丹參

各一
兩

麝香

研一
分

牛黃

研半
兩

葇荑子

酒浸一宿暴
乾蒸熟八合

大黃

濕紙裹
煨二兩

右搗羅為末煉蜜和丸如小豆或如黍米大臨時量
兒大小虛實與服溫酒下

牛黃散 治小兒驚癇發無時候

牛黃

細研

赤芍藥

露蜂房

黃芩

人參

去蘆頭

葛根

剉

甘草

炙微赤剉

蚱蟬

去翅足微炒

芎藭

川

芒硝

蜚蠊

微炙

桂心

各一分

當歸

剉微炒

石膏

各半

蛇蛻皮

五寸炙黃

川大黃

半兩剉碎微炒

杏仁

一分

湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃

右件藥搗羅為末散每服一錢水一小盞煎至五分
去滓溫服更量兒分四服四歲已下一九分五服新
生孩兒一九分七服並用蜜水磨下如中風者髮直
面如桃色口眼俱閉喉中作聲汗出如油及汗出不
流多要下泄或瀉血者並是惡候更不用服唯口噤
眼開者藥下立瘥如患瘕雖風壅塞氣息不通將絕
者急化一九生薑薄荷酒下必效

牛黃丸 治少小痰實結癖或腹內堅強驚癇百病

牛黃 玄參 乾薑 各二分 苦參 丹參 桔梗

甘草 人參 各四分 甘遂 炒 沙參 各五分 麝香

十四箇 大黃 十二分 蜀椒 四分 出汗 巴豆 一百枚 去皮心炒別

入研 葶藶 一合 半炒

右為末蜜丸如小豆大一服二丸米飲下

歸魂丸 治小兒驚癇搐搦涎潮昏塞

史君子 兩枚以麵裹於慢火中煨候麵黃為度去皮不用 水銀 結沙

香墨 蘆薈 熊膽 研 臘茶 研 乳香 研 龍

腦

各一錢研

蝎梢

三十枝炒

天竺黃

青黛

研

丹砂

半研錢各

輕粉

二錢

寒食麵

一錢半

右同研令勻細滴水丸如菉豆大每服一九薄荷蜜水化下如小兒稍覺驚者化半丸與喫若能常服永無驚疾量兒大小加減

鎮心丸

治小兒驚癇

金銀箔

各細研五十片

防葵

半兩

水銀

以少棗瓤研令星盡

鐵

粉

細研

真珠

末

紫石英

細研水飛過

雄黃

細研

人

參

去蘆頭

白芍藥

各半兩

牛黃

細研

遠志

去心

白

飲

各一分

漢防己

川大黃

剉碎微炒

茯苓

各三分

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如棗豆大每服以薄荷湯研下三九日三服看兒大小加減

柴胡煎

治小兒驚欲作癇

柴胡

去苗

升麻

梔子仁

芍藥

各三分

釣藤

各一

分

凝水石

研

黃芩

生薑汁

合

知母

切焙各一

兩

甘草

炙一分

蜜

二合

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒別研半兩

淡竹葉

細剉
三握

右麤擣篩以水三升入銀石銚內文武火煎至一升
綿濾去滓再入鍋內下蜜并葛汁杏仁等煎如飴以
甕器盛百日兒每服如菜豆大一歲如杏仁大日三
服更量大小加減溫漿水化破服

萬病丸 治小兒驚癇乳癖

雄黃

研

丹砂

研

麝香

研

龍腦

研

蘆薈

研

木香

檳榔

剉各
一分

牛黃

研半
兩

胡黃連

分一

青

黛

研半兩

巴豆

去心皮膜
研出油盡

桂

去粗皮

人參

各分

右研為末煉蜜丸如小菰豆大每服一九至二九溫水下更量大小加減十五歲已下常服永無諸疾

虎睛丸

治小兒驚癇邪氣皮肉壯熱嘔吐心煩不得

安睡

虎睛

一對
細研

牛黃

天竺黃

麝香

各細研
一分

川

大黃

一兩剉
碎微炒

川升麻

釣藤

甘草

炙微
赤剉

犀

角

屑

梔子仁

各半兩

蚱蟬

蜚螋

各去翅足
微炒三枚

蛇蛻皮

五寸
燒灰

右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒以粥飲研三丸

量兒大小加減

鉛霜丸 治小兒驚癇發熱搐搦不定

鉛霜

細研

馬牙

各半
兩

硃砂

細研水
飛過

鐵粉

細研各
一兩

麝

香

細研
半分

川大黃

細碎
微炒

人參

去蘆頭
各三分

羌活

芎

翳

白茯苓

牛黃

細研

乾蝎

微炒

龍膽

去蘆頭
各一分

右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸如菉豆大每

服不計時候荊芥薄荷湯下五九量兒大小加減

牛黃豚血湯 治小兒驚癇制手縮不止

豚血 牛黃 當歸 大黃 人參 各四分 蜚螋

蚱蟬 各三枚 灸 川芎 黃芩 各八分 葛根 十二分 鼠

屎 四兩 蛇蛻 五寸 蜂房 八分

右以酒五升煮取四升去滓服二合日三夜二此論
一歲兒耳三歲兒服三合神效

保和丸 治小兒癇身熱手足瘈瘲目睛上視狀如中

風

丹砂

研一錢

蝎稍

二十箇

雄黃

研二錢

蘆薈

研

熊膽

研各半錢

蛇蛻

燒灰一錢

瓜蒂

二十枝

蟾酥

一皂子大

湯浸

膩粉

研

龍腦

研

麝香

研

牛黃

研各半錢

右搗研如粉用浸蟾酥并麵糊同研為丸如黍米大每服用倒流水先化一丸滴鼻內良久嚏訖即用薄荷水一丸

青金煎 治小兒驚癇積熱痰涎咳嗽

天南星

牛膽內
置者半

馬牙硝

研

天竺黃

研各
一分

青

黛

研一
兩

龍齒

研

蟬蛻

去土為末
各半兩

鉛白霜

研

蓬砂

研各
一分

甘草

生末
三分

麝香

研一
錢

牛黃

研各
一錢

右研勻細蜜和為膏斂合內收每服一小雞頭實大
更量兒大小加減薄荷水化下

大釣藤飲

治小兒驚癇壯熱

釣藤

黃芩

去黑
心

麻黃

去節各一
兩一分

龍齒

研一
兩

甘草

研二
兩半

石膏

研二
兩半

赤芍藥

去黑
心

桂

龍

膽

去土

牛黃

研一兩

杏仁

去雙仁皮尖
麩炒研半兩

右麝搗篩十味每服三錢七水一盞煎至六分去滓
下牛黃杏仁膏加白蜜竹瀝各少許煉如飴湯調服
如人行五里再服

虎睛丸

治小兒驚癇邪氣身熱嘔吐下痢五色

虎睛

一枚研

牛黃

研

麝香

研各半分

升麻

釣藤

生犀角

桂

去粗皮
各一分

山梔子

一兩

蚱蟬

炙去頭
足翅

蜚螳

蛇蛻皮

五寸
燒灰

大黃

蒸二度剉
焙二兩

右研為末煉蜜丸如梧桐子大每服三九至五九食後米飲研下日再服

癰癩湯 治大人風引少小驚癰瘰癧日數十發醫所不療除熱

大黃 乾薑 龍骨 各四兩 桂枝 三兩去皮千金用五兩

甘草 炙 牡蠣 各二兩熬干金各同五兩外宜各三兩 凝水石

滑石 赤石脂 白石脂 石膏 紫石英 各六兩外

臺此六味各八兩

右杵麤篩以韋囊盛之取三指撮井花水三升煮三沸去滓溫服一升巢源脚氣宜風引湯○千金紫石煮散與此方治療藥味皆同外臺崔氏紫石湯療藥味亦同有分兩不同者各注于下注云永嘉二年大小兒頓行風癇之病得發例不能言或發熱半身掣縮或五六日或七八日死張思惟合此散所療皆愈此方本仲景傷寒論方

鎮驚丸 治一切驚癇

紫石英

燒醋
淬研

鐵粉

茯神

遠志肉

薑製
焙

人

參

琥珀

滑石

南星

炮

蛇黃

煨醋
淬各一分

龍

齒

熊膽

半分

輕粉

右為細末煉蜜丸硃砂為衣桐子大每服一九金銀湯調下或用豬乳調拭入口中

牛黃丸

治少小癰實驚癇百病

牛黃

芒硝

甘草

炙

人參

各四分

甘遂

炒

沙參

各五分

廬蟲

十四枚

大黃

十二分

蜀椒

四分出汁

巴豆

一百枚去皮心炒黃別研入

葶藶

一合半炒

真珠

末

右為末蜜丸如小豆大一服二丸飲下

紫石英散

治小兒風熱驚癇手足掣縮日數發者

紫石英

一兩

寒水石

一兩

龍骨

半兩

牡蠣

半兩

滑石

一兩

赤石脂

半兩

藍葉

一分

川大黃

一兩

剉碎微炒

石

膏

一兩

白石脂

桂心

甘草

各半兩

炙微赤剉

右件藥搗羅散每服一錢水一小盞煎至五分去渣

量兒大小加減溫服

人參湯 治小兒邪熱驚癇口噤

人參

一兩

木通

剉

黃芩

去黑心

升麻

各半兩

龍

齒

研三分

犀角

鎔炒

赤茯苓

去黑皮剉

鐵粉

研各半兩

蜣螂

十枚去足炒

釣藤

半兩

蚱蟬

去足翅炙二七枚

右麤擣篩三四歲兒每服一錢水一盞煎至五分入

竹瀝少許更煎三兩沸去渣分為三服日三更量大

小加減

虎睛丸 治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏

丹砂

研一兩

虎睛

對研一

牛黃

研

麝香

研

犀

角

未各一兩

釣藤

四兩

白茯苓

去黑皮剉

黃芩

去黑心

人參

梔子仁

各一兩

大黃

濕紙裹煨熟剉二兩

右搗研為末煉蜜丸如鷄頭大每服一九或二九煎

金銀湯化下人參湯亦得更量兒大小加減聖濟用

龍腦一錢半

鎮心丸

治小兒驚癇

銀箔

研一百片

大黃

剉炒

丹砂

研各一兩

蜚螳

三枚去頭足炒

升麻 黃芩 去黑心 犀角 屑 梔子仁 龍齒

麥門冬

去心焙

鐵粉

各一兩

右搗研為末煉蜜丸如梧桐子大食後及乳後新汲水研一丸灌之三歲及五歲兩丸至三九七歲至十歲五丸如大人患者溫漿水下十五丸如冬月以溫水研灌之

釣藤子芩湯 治小兒驚癇體虛

升麻

一兩

黃芩

沙參

各三兩

知母

焙

犀角

各銖

兩

釣藤

蛇蛻皮

蚱蟬

三枚炙去翅頭足

柴胡

去苗

甘草

炙剉

白朮

半兩各

右麤擣篩以水二升煎去渣取六合入蜜二合竹瀝三合再煉如飴每服一錢微微與服以意量之

竹瀝湯

療暴得驚癇立驗方

釣藤

茯神

黃芩

升麻

白鮮皮

沙參

各二

兩

龍齒

三兩

蚱蟬

七枚去翅炙研湯成內之

石膏

八兩

寒

水石

六兩碎研

甘竹瀝

二升湯熱內之

右以水九升煮取三升溫三服相去六七里久若小
孩子患藥各減量取多少細細飲之立瘥忌醋物

至寶丸 治小兒驚癇頻發不定

川升麻 子芩 犀角

屑各一兩

金銀箔

各五十片細研

梔子仁 川大黃

剉碎微炒

硃砂

細研水飛各一兩

鐵粉

龍齒

並細研各二兩

麥門冬

一兩半去心焙

蜚蠊

三枚去翅足微炒

右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸如麻子大每
服煎竹葉湯研下五丸更量兒大小加減

羚羊角丸 治熱風常發驚癇每發或吐沫

釣藤 防葵 人參 羚羊角 屑 茯苓 遠志

去心 漢防已 各八分 麥門冬 去心 龍齒 研各十分

鐵精 六分 杏仁 十分去皮尖炒別研入

右為末蜜丸大豆大飲下三十九丸漸加至五六十丸
常服大佳忌猪肉及醋小兒量多少服

奪命散 治驚風癇病眼目翻視牙關噤急口內無氣
脣赤並皆治之

蜈蚣 輕粉 硃砂 麝香 白附子 牛黃_{上已}

各一 蟾酥_{半錢} 水銀_{用棗肉少許不見星秤一錢} 天南星

一去 筒心 真珠_{末一字} 巴豆霜_{三箇去油}

右為末棗肉為丸每服三丸薄荷湯下口禁不開研灌入鼻中心煩壯熱荊芥湯下加減

比金膏 治驚癇先用此

人參 琥珀 白茯苓 遠志肉_{薑製焙} 硃砂

天麻 石菖蒲_{細節去} 川芎 南星_{薑汁浸焙二錢} 麝

一 青黛 錢一

右為末煉蜜九桐子大每服一九金銀煎湯泡薄荷

調下

偏銀丸 治小兒驚癇涎盛搐搦不定

天南星 錢半

青黛 錢一

蝎梢 炒四枚

粉霜 研

水銀 滑石 錢各一

半夏 七枚用生薑汁一升煮

龍腦 研

麝香 研半 膩粉 錢研半

右研為末用水浸炊餅和丸如梧桐子大捏作餅子

每服一餅至二餅量兒大小加減薄荷湯下

虎睛丸 治小兒孩子二十四種驚癇壯熱抽掣脚手

嘔吐夜啼眠睡不安驚癇

虎睛

一雙聖惠用一對

梔子仁

茯苓

各二分

牛黃

少許

聖惠用半兩

人參

一分聖惠用一兩

釣藤

大黃

各四分

犀角

末一分聖惠用二兩

黃芩

一分聖惠用一兩

蛇蛻

七寸燒灰聖惠

用一分

右為末煉蜜丸黍米大空心用熟水下隨年丸數輕

者一服重者三服妳汁下亦得或粥飲下量兒大小
以意加減妳母忌一切生冷油膩等物

蛇蛻皮散 治小兒驚癇發作不定

蛇蛻

五寸
炙黃

蚱蟬

十枚

蜣螂

三枚去翅
足微炙

麻黃

去根

節

甘草

炙微
赤剉

當歸

微炒
剉

細辛

黃耆

剉各
半兩

人參

三分去
蘆頭

川大黃

一兩剉
碎微炒

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓
入牛黃二豆許攪令勻溫服更量大小以意加減小

兒體氣羸者以桂心二分代大黃治百病驚癇初瘥
後變成諸疾風癇悉治之

犀角煎 治小兒發驚癇體瘦煩熱

犀角

屑

知母

川升麻

各一兩

子芩

人參

去蘆

頭

釣藤

各三分

蚱蟬

去翅足二枚微炒

蛇蛻皮

三寸微炙

甘草

炙微赤剉

紫胡

去苗各半兩

右為末用水二盞入銀鍋中以文武火煎取六分去
滓入蜜二合竹瀝一小盞再煎如飴每服抄半錢以

溫水化服更量兒大小加減

碧雪 治大人小兒心熱驚狂諸癇熱病皆主之

川升麻 二兩 黃芩 釣藤 犀角 屑 青黛 各一兩

虎睛 一對 天竺黃 半錢 腦麝 各一分 川朴 一兩 竹

瀝 三合

右虎睛天竺黃腦麝青黛等細研入餘藥並細剉用水一斗煎至三升濾去滓澄清下朴硝微火更煎以柳木萬攪勿住手候消散下竹瀝并研了藥更攪令

勻候稍凝即於新瓦盆中盛經宿即凝搗羅為散每服金銀湯調二錢食後并夜臨睡時服老少以意服

釣藤散

治小兒四五歲忽患驚癇

石膏

細研水飛過

釣藤 梔子仁

各半兩

犀角

屑

牛黃

細研

防風

人參

各去蘆頭

獨活

各一分

虎睛

一對 蚱蟬 一枚各微灸

右搗細為散每服一錢水一盞煎至五分和滓分為二服如人行二三里進一服更量兒大小加減

桃奴丸 治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客

忤魘夢不祥小兒驚癇並宜服之

桃梟

七枚別為末桃不成實經冬在枝上不落者是也

安息香

一兩以無灰酒

酢酌炙少研飛去砂石銀器入上一味同桃仁一處熬成膏

桃仁

十四枚去皮麤以別

研同已上二味熬膏

琥珀

三分白研

生玳瑁

鎔過杵為末要細一兩

雄黃

用桃煮水研飛取三分

辰砂

研飛半兩

黑犀

石上以水磨澄去水

取末半兩

牛黃

腦麝

各別研一分

右為細末和前膏丸如鷄頭陰乾密器封安淨室人

參湯研服一九食後臨睡時服

鷄石香丸

治憂恚所衝痞結等氣胃管室塞噎悶臍

腑積聚欲作癥瘕酒食毒痰癖嘔逆有妨食飲兼治

小兒驚癇客忤泄利

鷄舌香

用母丁香

墨

畧燒

麝香

牛黃

並別研

犀角

末

鐵鐸粉

各一分半

棗

五枚燒存性

荆三稜

末一錢

烏梅肉

焙乾一分

巴豆

大者十五枚去皮心膜漿水煮三五十沸再入麴炒令赤

研色別

右為末煮糊丸黃米大每服三五丸煎人參湯下漸加至七九十九食後服

牛黃丸 治少小癖實驚癇百病

牛黃 芒硝 真珠末 甘遂炒 雄黃各四分

麝香一分 巴豆五分去皮心炒別研入 蜀椒三銖炒汗 蜈蚣

一條去足 蚱蟬十四枚炙

右為末入巴豆勻次下真珠末煎蜜三合令如白蠟一兩水煎和熟下諸藥杵和得所有病者一服如麻

子大二九飲下旦服快下為度以意加減

鎮心膏 治驚癇及發癇挾熱者尤宜服之

遠志

一兩
去心

漢防已

人參

去蘆
頭

川大黃

微炒

茯神

各半
兩

已上為細末次用

好硃砂

一兩
細研水飛

龍腦

一錢
細研

金箔

三十片
各細研

銀箔

十片
細研

水磨雄

黃

一分
細研水飛

右拌勻煉蜜成膏每服一皂子大薄荷湯化下乳後

服

蚘蛭丸 治小兒因吐瀉後虛風眼澀潮搐驚癇及丈夫婦人一切虛風頭旋眼黑惡心吐逆筋脉堅緩手足麻木身體疼痛精神不爽並皆治之

全蝎

微炒

白殭蠶

雄黃

炒

白附子

炮

天麻

剉碎

硃砂

麝香

各細研

天南星

濕紙包炮碎用

半夏

湯泡五七次去黑臍生薑三分取汁煮令盡焙朝各一分

烏蛇稍

尾穿一百足錢者佳

於須後麤度取七寸酒浸七日去皮骨慢火炙黃

右同研細生薑汁煮稀糊為丸如黍米大每服三歲

已下七九五歲已下十九五歲已上十五九荊芥湯
下不計時候如紫豆大每服二十九荊芥茶下如急
用即以二十九丸研碎用荊芥生薑濃煎湯化下

安驚丸 治諸驚風癇或大聲異物驚忤打墜不省人

事並主之

遠志肉

薑汁
浸焙

淨錢粉

硃砂

人參

茯神

各半

兩

全蝎

二十箇
焙

南星

中者一箇薑汁
浸一宿切細焙

白附子

畧炮二
錢半

花蛇頭

酒浸一
宿焙

麝

半錢

右為末煉蜜丸桐子大每服一九菖蒲燈心煎湯下
龍骨散 療大人風引少小驚癇制手癡日數發醫所不
能療除熱

龍骨

大黃

乾薑

各四兩

牡蠣

熬

滑石

赤

石脂

白石脂

桂心

甘草

炙各三兩

右搗不篩韋囊盛大人三指撮以井花水二升煮三
沸藥成適寒溫大人服一升未滿百日兒服一合未
能飲者綿裹筋頭內湯中着小兒口中以當乳汁熱

多者四服每服以意消息之忌海藻松菜生葱一方
無大黃赤石脂桂心甘草

五癰煎

一名釣
藤煎

療小兒驚癰體羸不堪療

釣藤

二分

知母

子苓

各四分

甘草

炙

升麻

沙參

各三分

寒水石

六分

蚱蟬

一枚去
翅炙

蜚螬

三枚

炙

右搗篩以好蜜和薄泔着銅器於沸湯上調之攪不
停手如飴糖煎成稍別出少許百日兒噉之一枚棗

核大日夜五六過服不妨五六日兒噉三枚百日兒
噉之四枚二百日兒三百日兒噉五枚三歲兒噉七
枚以意量之

釣藤散 治小兒忽得驚癇壯熱口燥

釣藤 白茯苓 黃芩 川升麻 白鮮皮

各三分

龍齒 玄參 石膏 寒水石

各一兩

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓
入竹瀝半合攪令勻重煎一兩沸分溫二服更量兒

大小加減

雄珠散 治小兒鎮心驚癇

硃砂

雄黃

真珠

末

硼砂

水銀

鉛

各半兩先

將鉛在銚子內煮鎔便放水銀轉攪成沙子瀉出放冷即用

全蝎

白附子

各三錢

腦麝

隨意入

右各研一處為末每服一字半錢荊芥薄荷湯入蜜少許調

清神湯 治驚癇

犀角 遠志肉

薑製 焙

人參

甘草

炒各一錢

大黃

焙

茯神

半兩

白鮮皮

石菖蒲

半夏

製各一分

右為末每服三字去心麥門冬湯調下

釣藤飲 治小兒驚癇疾

釣藤 黃芩

去黑心

犀角

鎊各半兩

石膏

碎

龍齒

各一兩

升麻

甘草

炙剉各三分

竹葉

四十片

右咬咀如麻豆大每服一錢七水一盞煎至半盞去

滓入麝香少許溫服更量兒大小加減

人參 牡蠣 雷丸 各半升 沙參 苦參 玄參

丹參 大黃 三升

右以水三升作東向竈以韋薪煮三沸停後小沸留之度一斗許去滓先以三指染藥汁注兒口二七已大染手混吻額背以後如炊物溫之再浴度盡七升止一日一浴甚者三浴三日無令兒見風浴時避日及陰之

天竺黃散 治驚癇啼叫

天竺黃

研一兩

牡蠣粉

白芍藥

犀角

屑

白

附子

天麻

乾蝎

人參

各半兩
去蘆頭

右為末每服一錢水分生薑薄荷各少許煎四分去

滓溫服

蛇蛻丹

治驚癇涎盛

蛇蛻皮

五寸
燒灰

麝香

牛黃

膩粉

天竺黃

各細

研

釣藤

取末各
一分

虎睛

一對

蜚螳

三枚去翅足
微炒取末

右拌勻煉蜜和丸黍粟大每七粒至十粒麥門冬去

心煎湯下

萬全犀角丸 治小兒驚癇壯熱心神不定

犀角

屑半兩

硃砂

天竺黃

麝香

牛黃

各細研

乾蝎

微炒

天南星

炮

人參

已上各一分

右為末水浸蒸餅和丸如菉豆大每服三丸薄荷湯

下量兒大小加減

安神散 治小兒驚癇手足瘈瘲頭項強硬狀如角弓

蝎梢

炒一錢半

蜈蚣

赤足全者一條

輕粉

一字

烏頭尖

生用

簡七

天南星

用生薑汁搗作餅
子焙乾秤半錢

麝香 龍腦

各研

字七

右研為散每服一字匕量兒大小加金銀薄荷湯調
下

釣藤散 治小兒驚癇仰目嚼舌精神昏悶宜服

釣藤

川大黃

剉碎
微炒

子芩

各半
兩

龍齒

一兩

麥

門冬

去心
焙

石膏

各三
分

梔子仁

一分

右麝羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量

兒大小加減不計時溫服

犀角丸 治小兒驚癇壯熱心神不定

犀角

屑

麝香

各半兩

硃砂

天竺黃

牛黃

研細

乾蝎

微炒各一分

天南星

炮製半分

右為末水浸蒸餅和丸如菜豆大每服薄荷湯下三
九日三四服量兒大小加減

百病湯 治小兒驚癇脹滿掣縮吐衄

黃耆

黃芩

釣藤

各一分

蚱蟬

三分炙

甘草

二分

炙

蛇蛻皮

一寸

牛黃

三銖

右為末以水一升半煮取六合百日兒與半合服二歲三合服取利為度有汗則以粉粉之

蚘蚘散 治小兒驚癇搐搦眼上視身熱

蚘蚘

白附子

硃砂

各一錢末

巴豆

四十四箇
研不去油

膩粉

半錢

棘罔子

三枚
去殼

麝香

一字

右細研勻如麵每服一字再研薄荷湯調下量大小用藥

紫水膏 治小兒驚癇手足瘈瘲身熱眼上

紫水

一錢重棗肉五箇研永成泥然後入諸藥

硃砂

研細末二錢

蝎尾

七箇

黑附子

大一箇

生薑

一塊去皮

膩粉

五錢

生

天南星

心中末一錢

右研為膏每服鷄頭大薄荷化開量大小用微取下
涎效

七寶鎮心丸

治驚癇心熱

遠志肉

薑製焙

雄黃

鐵粉

琥珀

各二錢

硃砂

錢一

麝

少許

金銀箔

二十片

右為末棗肉丸桐子大每服一九去心麥門冬煎湯

下

牛黃散

治小兒驚癇腹中乳癖

牛黃

一分

人參

半兩

大黃

剉炒

當歸

剉焙

芍藥

甘草

剉各一兩

右研為散每服一錢匕以水七分煎取三分去渣量兒大小加減溫服微利為度

白鮮皮散

治小兒驚癇邪氣發即吐涎迷悶難醒

白鮮皮

釣藤

龍齒

各一兩

犀角

屑

子苓

各三

分

蚱蟬

半兩去翅足微炒

右麤羅為散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎至五分去渣量兒大小加減服之

犀角丸

治小兒驚癇多涎體熱

犀角

屑

天麻

白附子

炮製

天竺黃

鉛霜

並細

研各半兩

硃砂

一兩細研水飛過

右為末入研子藥更研令勻以軟飲和丸如菽豆大
每服煎竹葉湯下五丸看兒大小加減丸數服之

龍腦丸 治小兒驚癇煩熱眼睡不安

龍腦

半分
細研

硃砂

一兩
水飛過
細研

粉霜

半兩
細研

鐵粉

龍齒

二兩
細研

人參

三分
去蘆頭

右為末入研藥同研藥令勻煉蜜丸如麻子大不計
時候以粥飲下五丸更看兒大小加減

麻黃拭體丸 治小兒驚癇

麻黃

去根節

葛根

雷丸

各三兩

金

各一兩

石膏

五兩末

蛇蛻皮

一條

右細剉用水七升煎取一升去渣以軟帛浸拭兒身

上

虎睛丸 治小兒二十四種驚癇壯熱抽掣手足嘔吐

夜啼睡不安

虎睛

一對微炙細研

牛黃

細研

川大黃

剉碎微炒

白苓

各一

分

人參

半兩去蘆頭

蛇蛻皮

五寸微炒

右搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大一二歲兒每服以
乳汁化破二丸服三四歲兒薄荷湯化破五丸服更
看兒大小加減

牛黃散 治小兒三十四種諸驚癇眼口牽掣嚼舌反
物

牛黃

一分
細研

石膏

細研

釣藤

各一
兩半

甘草

炙微
赤剉

白

鯁

各一
兩

蛇蛻皮

半
分炙
令黃色

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去渣

入牛黃一字不計時候量兒大小加減溫服

犀角散 治小兒百日以來至三四歲肝心風熱發驚

癇掣癡身體如火並皆治之

犀角

屑

釣藤

黃芩

川升麻

各一兩

龍齒

二兩

麥門冬

一兩半
去心焙

右搗麤羅為散每服一錢用水一盞入竹葉七片煎

至五分去滓量兒大小加減溫服

蛇蛻皮丸

治小兒驚癇除熱常服

蛇蛻

炙

細辛

黃芩

蜚螋

炙用自飛者

牛黃

各一

分

大黃

五

右為末蜜丸小豆大服三九不知稍增之日三

犀角丸

治驚癇悶亂

犀角

屑

天南星

微炒各一兩

乾蝎

半兩

已上為細

末次用

硃砂

細研半兩水飛

牛黃

麝香

一錢研

右拌勻水浸蒸餅丸黍米大服十五粒並人參湯下

犀角

一兩屑

人參

半兩

茯苓

半兩

麥門冬

半兩去心焙乾

黃芩

半兩

甘草

半兩
炙

右為末每服一錢水八分入生地黃汁少許同煎四

分去滓溫服

寒水石散

治小兒驚癇四肢抽掣及身體反張目睛

上視色青大叫聲不轉者服

寒水石

紫石英

石膏

貝齒

各半兩

龍齒

一兩

右搗研以水二大盞煎至一盞去滓量兒大小分減

服

大驚丸 宣利小兒熱毒涎并潮搐等癇疾

蛇黃

一枚火煨
醋淬二錢

青礞石

一錢

辰砂

雄黃

各二錢

鐵鐸粉

四錢
極細

右為末化蒸餅丸金銀刀股湯五歲已上吞下幼小
花下如麻子大利即止藥末知再服

二砂散 治小兒驚癇

夜明砂

研一錢

丹砂

研一錢

蝎梢

炒七枚

輕粉

研一錢

錢

右為散服半錢七童子小便并酒各少許調下量大
小加減

孩子百日内驚癇驗方

黃梨汁和黃梨花

偏治驚癇力更加

牙硝入之一大分

亦須更着小鈇華

鈇華
黃丹

也

牛黃散子 治小兒驚癇熱躁發歇不定宜服

牛黃

一分

馬牙硝

鐵粉

龍腦

各三分

右為細末為散每於乳食後以熱水調下半錢量兒
大小加減一方用龍齒

蛇黃丸 治小兒驚癇

蛇黃

三枚大者細研

麝香

半分

麝香

三分為末

金銀箔

各細

研五
十片

右同研令勻以粳米飯和丸如菉豆大每服用磨刀
水煎一兩沸如人體下三丸更看兒大小加減一方
無銀箔

極妙方 治小兒驚癇

鐵粉

石膏

牡蠣

各一分

黃丹

兩半

右細研為散以井花水調下半錢量兒大小加減服之

子芩散 治驚癇發熱并無癇似熱即與服

升麻

子芩

犀角

屑各三分

大黃

六分

右水二升半煮一升二合候溫漸與服微利三兩行

忌麵猪魚醋物

葛散子方 治少小驚癇掣癇一日一夜餘發

葛根

雄黃

甘草

炙各六分

當歸

二兩炒者

右為末取一小豆乳汁和令嚥之日夜三四服不可服用當歸半兩小豚卵一具並切酒一升二合煮八分服半合至一合量兒大小日夜三四服大妙

二氣蝎稍散 治小兒驚癇

青州白丸子

半兩

陰陽硫黃

係生熟者各用葉豆大

全蝎

兩箇

全者不得用火焙要曬乾一法用蝎稍

右為細末每一歲至五歲半錢六歲至十歲一錢用
無灰酒下忌動風物小兒姪母亦忌口若驚發作用
無灰酒下一大錢病除過十服

辰砂乳香丸

亦名鎮驚安神

治驚癇胎風壯熱瘰癧弄舌搖

頭眠睡不穩目睛上視口眼牽引痰實咳嗽咬齒謔
語

半夏

炮

乳香

硃砂

各研

右各等分麵糊丸每服十九乳食後溫薄荷湯下量

兒大小加減

丹參摩膏方 治小兒驚癇除熱

丹參 雷丸

各半兩

猪膏

二兩

右件藥細剉猪膏入銀器中煎然後納諸藥煎七上
七下膏成綿濾去滓用瓷合中盛以摩兒身日三用
之

天南星丸 治男子婦女上膈痰壅頭目昏眩咽喉腫

痛小兒驚癇潮熱一切涎積等患

天南星

四兩湯浸
去皮臍

齊州半夏

二兩
同上

右焙乾以生薄荷葉五斤搗取自然汁一大碗藥浸
焙直候藥盡搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服
十九五丸生薑薄荷湯吞下兒丸如黍米每服七丸
至十九驚風金銀薄荷湯下心臟壅熱荊芥薄荷湯
吞下食後臨卧服

治驚癇發熱無癇但似熱即與服之

乾鹽

凝水石

各等
分

右為末水調傳頭大佳醫云此病是氣不通常以薏苡仁紫蘇粥食大良

當歸湯

治少小驚癇壯熱中風四肢掣癱舌書沫

當歸

二分

豚卵

一雙切細

右二物以淳酒三升煮取一升為二服兒小即用一卵一本棗二十枚大者

治小兒驚癇制手癱方

右用虎睛一隻或一對生者尤佳為細末研水調灌

之量兒大小加減

治小兒癇方

右用以猪齒燒灰飲服半錢並治蛇咬

治小兒驚癇方

右用以蛇黃以水煮研取汁服一方用水磨服之

廣利方 治小兒驚癇不知迷悶嚼舌目仰

右用以牛黃一大豆許研和一盞水服

治小兒驚癇制手癡方

右用取熊膽一兩豆大和乳汁及竹瀝汁服並良得去心中涎至良

治小兒驚癇方

右用以青牛肝一具細取薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之

治小兒驚癇發動無時

右用以猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之多尤佳

治小兒壯熱痰吐不佳驚癇

右用以葛粉二錢水二合調勻瀉向鏹鐸中傾側令
遍重湯中煮令熟以摩飲相和食之

治小兒驚癇

右用以殺羊角燒灰酒服少許或以羚羊角亦可治
山瘴并惡血又云治噎食不通皆良

羊頭肉方 治中風目眩羸瘦小兒驚癇及五勞手足

無力

右用白羊頭一枚洗如法蒸令極熟細切以五味汁

食之或作鱸入辛醬醋食之

又方 治驚癇發熱如無癇但似熱即與服之

右用取月候血和青黛新汲水調一服大一錢入口
即瘥量兒增減如神

又方

右用以熊膽水調少許妙

又方

右用以麻油少少喫之亦好

又方

右用以鐵粉水調常服

神驗方

一名蝎虎散

治久患驚癇心血不足

右用蝎虎一枚褐色者用剪子取下四足爪連血細研入生硃末麝香腦子各少許研細薄荷湯調作一服須先用奪命散控下涎次服之能奪造化雖數年癲癇亦能除之此藥所以神效者蓋癇病皆心血不足此物可守宮其心血之血類也助以二陳湯與之

若無生蝸當取帶性雄猪心血代用入于代赭石散
中一作效取下如室女之於心故能補也心全則病
瘥豈非神聖功巧乎余侍郎之子已是廢人服之全
愈余常試之必效但害一物而救一人此乃怪蟲去
其足而復能行又再生而活

蜜佗僧飲 治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通
用

右用佗僧為細末每服一字米醋湯下大人用二錢

熱酒調下

治小兒驚癇補虛氣乏

右用豆牙豬頭一枚治如食法煮令極熟停冷作鱠以五辛醋食之

治小兒汗出舌上白受驚者衣厚過熱也鼻上青及下痢青乳不消喜啼者衣薄厚冷也小兒多患胎寒如啼晝夜不止因此成癇宜急與當歸散

右用當歸末取小豆大取乳汁以咽之日夜三四度

即瘥若不瘥當歸半兩小豚卵一具並切之以酒一升二合用煮取八合服半合至一合隨兒大小日三夜四神效

又方 治驚癇

右用以鷄子黃和乳汁量兒大小服之不過三兩枚自定

五味麝香餅子 治小兒驚風發癇目睛邪視胃膈多痰搐搦不定神昏不醒又治變蒸溫壯不解

麝香

半錢
研

青黛

三錢
研

全蝎

去毒生用
一十五枚

蜈蚣

一對
生用

石膏

飛研細
一兩

右為細末研勻湯浸油餅為丸如梧桐子大捏作餅
子每服五七餅子用金銀薄荷水化下

粉紅丸

又名溫
驚丸

治小兒驚癇搐搦目睛上視

天南星

為末入臘月釀牛膽中百日陰乾取
末四兩另研如無釀者只剉炒熟用

硃

砂

一錢
半研

天竺黃

一兩
研

坯子臘脂

一錢
研九
染臘脂

龍腦

右同牛膽汁和丸鷄頭大每服一九小者半丸炒糖
溫茶化下

紅丸子 治一切驚癇化痰

白礬

三枚出
火毒

半夏

一分
地

雄黃

一錢三
分半

硃砂

二錢二
分半

右將半夏末作生薑自然汁煮糊丸如菉豆大每服
二十七丸以痰不為度以一半硃砂為衣

治小兒驚癇大人見鬼方

右用狐肉亦作羹食之良

治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰面者方

右用犀角末半錢入水二大合服之立效

大醫局紫雪療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂
易叫走癰疫毒厲卒溫瘧五尸五疰心腹諸疾癰刺
切痛及解諸藥毒發邪熱幸黃等並解蠱毒魅野道
熱毒又治小兒驚癇百病

黃金

一百兩千金
翼用十六兩

石膏

寒水石

磁石

滑

石

各三觔搗碎千金翼無滑石

已上用水一斛煮至四斗去

渣入下項

玄參

洗焙搗碎

升麻

各一觔

羚羊角

屑

犀角

屑

青木香

沉香

並搗碎各五兩

丁香

一兩搗千金翼

用四兩

甘草

炙剉八兩

已上八味入前藥汁再煮取

一斗五升渣去入下項

硝石

四升芒硝亦得每升重七兩七錢半

朴硝

精者十觔千金翼用四觔

已上二味入前藥汁中微火

煎柳木篋攪不佳手候有七升投在木盆中半日

欲凝入下項

硃砂

飛研淨三兩

麝香當門子

一兩二錢

半研千金翼用麝香粉半
兩餘筋兩不注者皆同

已上二味入前藥中

攪調令勻寒之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下
大人小兒臨時以意加減食後服

牛黃保勝丸 治小兒驚癇衆疾身熱急驚不可服

天麻

一兩明
亮者

白附子

一兩末
浸一宿

南木香

一兩

丁香

一分

牛黃

半兩

黃耆

一兩

地榆

半兩
湯浸

麝香

犀角

末一分

大附子

一兩生薑半兩不蛀棗
子二枚水一大碗慢火

用煎附子水
盡去皮切

右件為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一粒用薄荷
湯化下

烏蛇散 治小兒驚癇並急慢驚

烏蛇

三寸去
皮骨

鼠糞

新者五
十粒

無蛙皂角

一定

右用新瓦上煨存性入麝香少許為末金銀湯下服
少許

硃砂丸 治小兒心肺積熱發驚癇煩悶吐逆心氣昏

迷痰涎壅滯

硃砂

牛黃

鈆霜

各細研

乾蝎

蠶蛾

並微炙炒各一

分

膩粉

腦麝

各細研半分

天漿子

二七枚內有物者微炒

右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大每服薄荷湯化五九量兒大小加減

保安丸

治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼牽引項背

強直精神昏困痰涎壅塞哽氣喘急目睛邪視一切

虛風並皆治之

附子

半兩炮
去皮臍

白附子

炮

天麻

全蝎

去毒
微炒

蔓荊子

防風

去蘆
皮頭

羌活

去蘆
頭

川芎

肉桂

去麁
皮

白殭蠶

炒去
絲嘴

當歸

洗焙十味
各一兩

烏蛇

酒
浸

去骨取肉焙
乾利半兩

乳香

一分
另研

右件為細末次入乳香研勻煉蜜為丸每服一兩作
四十九丸每服一丸煎荊芥湯化下不拘時候服

治小兒諸熱驚癇發熱方

右以青黛水研服

治小兒天癆驚癇客忤方

右用家桑東行根研汁服之

治小兒驚癇客忤鎮心安神方

右以麝香當門子一粒如丹砂相似細研熟水灌下
治驚癇精神恍惚言語錯繆歌笑無度兼五臟積冷蠱
毒寒熱

右以狐肉一片及五臟治如食法豉汁中煮五味和
作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁

治小兒驚癇壯熱方

右以槐葉煎湯服皮莖同用

治小兒壯熱痞疾驚癇方

右以李葉作湯沫之

治小兒驚癇方

右取鴈毛自落者小兒帶之又鴈喉下白毛療小兒
癇有效

治小兒驚癇方

右以馬齒水磨服之

又方

右以棘枝上雀甕研其間蟲書灌之

治小兒驚癇方

右以磁石煉水飲之

治小兒驚癇方

右以鷄腦燒灰酒服之

治小兒鬼驚癇方

右以虎煮汁浴之

治小兒發熱驚癇方

右以風涎母煮服之

癇瘥復發

附論

夫小兒患疾瘥後更發候癇發之狀或口眼相引目睛上搖或手足瘓癱或背脊強直或頭項反折或屈指如數皆由當風取涼乳食失節之所為其瘥之後而更發者是餘勢未盡小兒血氣軟弱或因食不節或風冷不

調或更驚動因而重發如此者多成常疾

紫金散 治小兒諸癇復發不問風之與熱發作多少

般數

紫金粉

一兩半一名赤烏角

牡蠣粉

麻黃

去根節

川大

黃

剉碎微炒各三分

石膏

細研飛過

地骨皮

赤石脂

各一

兩

烏蛇肉

炙令黃

黃芩

炙微赤剉

防風

去蘆頭

赤

芍藥

葛粉

牛黃

細研

甘草

炙微赤剉

秦艽

去苗各半

兩

羌活

桂心

各一分半

當歸

一分剉微炒

朴硝

寒水石

去苗各半兩

虎睛

一對微炙

右搗細羅為散都研令勻每服煎竹葉湯調下半錢
更量兒大小加減服之

百病欽丹丸

治小子驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不

避及除百病

松丹

硃砂

細研水飛過

鐵粉

牛黃

雄黃

各細研

細辛

獨活

露蜂房

炙黃

人參

去蘆頭

漢防已

桂心

甘草

川椒

去目及閉口者微炒去汗各一分

蜚螋

五枚

微灸

蛇蛻皮

五寸灸黃

鷄頭

一枚赤剉

赤茯苓

一兩

右為末煉蜜為丸和擣三二百杵如葉豆大每服以粥飲下五九量兒大小加減服之

鵝頭丸

治小兒驚癇發動經年不斷根源

鵝頭

一枚自死者灸令黃色

桂心

茯神

赤芍藥

露

蜂房

灸黃

甘草

灸微赤剉

當歸

剉微炒

芎藭

丹參

蜚螋

七枚去翅足微炒

麝香

一分細研

牛黃

細研

蛇蛻皮

五寸灸黃

葭若子

炒令黑各半兩

蚱蟬

十枚微灸

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如棗豆大每服以溫水下看兒大小加減服之

鎮心銀屑丸 治發癇雖瘥餘疾慮動防疾

銀屑 黃耆 大黃 鱉甲炙 甘草炙各四分 細

辛 桂心各三分 茯苓 柴胡 黃芩 人參

芍藥各三分 葵子三分 牛黃一分

右為末蜜丸大豆大一服五九日三服大良

天漿子丸 治小兒諸癇復發使斷根源

蟾蜍

三分
微炒

芎藭

半兩

知母

半兩

天漿子

十四枚
去殼別

研

人參

去蘆
頭

生乾地黄

桂心

各半兩

川大

黃

一兩半
剉碎微炒
嬰孺用十分

蜚螬

三枚
去翅微炙

蚱蟬

去翅足
微炙半

兩
嬰孺用一分

牛黃

一分
細末
嬰孺用三分

蜜蟲

三枚
炒黃
嬰孺用三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服以粥飲下三九日一服量兒大小加減服之

除病銀屑丸 治發癩雖已瘥而根源不斷至長將除

疾

銀屑

針一

紫苑

細辛

麻黃

去節

黃芩

各一分

人參

大黃

甘草

炙各二分

牛黃

四銖

右為末蜜丸小豆大一服二丸三丸

化痰丹

治胞絡痰涎諸癰瘰癧後皆宜常服此方

半夏

一兩湯浸七遍

乾薑

微炮

川黃連

去頭

桂心

南

木香

各半兩

已上先擣羅為細末次用

牛黃

麝香

各研一分

硃砂

一兩細研水飛

巴豆

十箇去皮心膜炒黃別研

右拌勻滴水如黍米大每服三粒至五粒溫粥飲

下未周歲嬰兒乳汁下謂如三歲至五歲不過五粒
量兒大小加減

斷癰丹 治癰瘡後復作證候多端連綿不除用驗

黃耆

蜜水
塗灸

釣藤

釣子

細辛

去根
土葉

甘草

灸
各

半
兩

蟬殼

四箇炒出洗
去土炒去足

牛黃

一字
別研

蛇蛻

三寸
酒塗
灸

灸

右為末煮棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲十
丸大小加減一方麵糊

治癰三十年患者一瘥方

苦參

二大觔

童子小便

一斗二升煎苦參取六升

右以粥米及麵和前汁作酒十餘日當熟澄清一服半鷄子許四五隻服一升永瘥非止癰疾但腹中諸病悉治神驗曾試亦治一切氣塊宿冷癖心痛惡病皆治放二三年酒不壞可多作救人神效

癰瘡身面腫

附論

夫小兒發癰瘡後身體頭面悉腫滿候七癰發之狀或

口眼相引或目睛上搖或手足掣癱或背脊強直或頭項反折或屈指如數皆由以兒當風取涼乳哺之所為也其癰瘡而腫滿者是風癰因小兒厚衣汗出因風取涼而得之其癰雖瘡血尚而熱未盡在皮膚與氣相搏致冷氣不宣泄故停并成腫也

方

黃芩湯 治小兒癰瘡後血氣尚虛而熱在皮膚與氣相搏通身頭面皆腫

黃芩

澤瀉

通草

木通也
各八分

桑白皮

各七分

澤

膝葉

四分

木猪苓

去皮

杏仁

湯浸去皮
尖各六分

柴胡

右為麤末每服方寸許水一大盞煎至五分小兒乳

食後服甚效

又方

龍腦

葵子

姜薤

茯苓

前胡

已上各一分

右為麤末每服方寸許水一大盞煎至五分小兒乳

食後服一合

癰瘡不能語 附論

夫發癰瘡後六七歲不能語者心之聲為言開竅於口其癰發雖止風冷之氣猶滯心之絡脉使心氣不和其聲不發故不能言也

補心湯 治小兒癰瘡後風冷留滯於心絡使心氣不和語聲不發宜千金大補心湯

黃芩 附子 炮去皮臍 各一兩 甘草 炙 茯苓 桂心

各三兩 石膏 半夏 遠志 去心各四兩 生薑 六兩

大棗

二十枝

飴糖

一觔

熟地黄

阿膠

麥門冬

去心各

三兩

右咬咀每服一大撮入前飴糖半匙許水一盞半煮

至半盞量大小分減乳食前服日三

羚羊角散

木通

剉

防風

去蘆頭

川升麻

羚羊角

屑

桂

心

已上各半兩

甘草

一分炙

右件藥搗為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去

渣入竹瀝少許更煎兩沸不計時服量兒大小加減服之

肥兒丸

治驚風後失音楊氏曰咽喉為之道路風傷

其氣故掩閉聲音道路之門亦有血滯於心竅不能言也可服

蕪荑

炒

神麴

炒

麥芽

炒

黃連

去毛各等分

右用猪膽汁糊為丸木通湯送下或木香陳皮甘草煎湯吞下

木通湯

木通

石菖蒲

防風

去蘆頭

枳殼

金蝎

焙

殭蠶

焙

甘草

木香

南星

右剉猪心二片或紫蘇生薑煎服

排關散

一名通關散

治小兒諸癇退後不能言

右用天南星泡為細散每服一字許猪膽調下嚥入
喉中即能言量兒大小加減一方用生薑薄荷蜜酒
調下一方用臘月牛膽釀南星不拘多少每服半字

薄荷湯調下卧時服兒大者服一字至半錢

截癇法

附論

夫小兒未發癇之先及欲發癇之候或壯熱連滯或搖頭弄舌或眼目抽掣如此是欲發癇宜療之也○小兒驚不已即變成癇疾又有不因驚而變成癇者然初亦有證可驗未發之前身體壯熱連滯不歇素有痰涎咽喉呀呷作聲或搖頭弄舌眼目邪視眠睡驚掣如此必是欲發癇之證宜截之

防病牛黃湯 治少小心驚又治癇發衆醫不復治者

牛黃 芍藥 杏仁 炒去皮尖 蜣螂 蜂房 黃芩

人參 葛根 甘草 炙 蚱蟬 炙 芒硝 川芎

桂心 各一分 大黃 三分聖惠用半兩 當歸 三分 石膏 四分

碎聖惠用半兩

右細切取豚五臟及卵以水一斗煮臟卵得三升去渣澄清納諸藥煮取一升三合去渣入芒硝洋盡一服一合日三夜一臨卧末牛黃納湯中常用大驗一

方蚱蟬蜣螂各五箇無芒硝用生薑三分水一升煮取二停

茯苓湯 治少小滯實不去內有熱搖頭弄舌欲作癰

茯苓

二分

蚱蟬

炙 二箇

雀甕

炙 二箇

蛇蛻皮

半

鐵精

芍藥

麻黃

去節

黃耆

柴胡

當歸

人參

各一分

右切以水三升先煮麻黃十沸去沫納諸藥煮一升五合為四服百日兒一日服盡大小加減

消熱定驚煎 治小兒驚熱欲發癇

柴胡

升麻

梔子仁

芍藥

各七分

子苓

知

母

各八分

寒水石

十二分

竹葉

切一分

杏仁

六分去皮

炙炒
別研

甘草

二分炙

右以水四升七合煮取一升半絞去渣內蜜葛汁於文武火煎攪勿住手至一升二合一月及初滿月兒一合為三服中間進乳出一月一服半合五六十日兒一服一合百日兒亦一合出百日服一合半一二

歲二合日二夜一冬溫服之

牛黃散 治小兒未滿百日聚口吐沫此欲作癇候腹
內有冷熱癖實宜服之

牛黃

細研

細辛

黃芩

當歸

研微炒

甘草

炙微赤剉

防風

去蘆頭各一分

柴胡

一分半去苗

川大黃

剉細微炒

蜣

螂

炙各二分

蚱蟬

三枚微炙

右搗細羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分和
渣不計時候量兒大小加減溫服

藍葉散 治小兒頭額體背俱熱大便秘澀眼赤心悶

乍睡乍驚精神昏濁與人不相主當欲作癇狀

藍葉 人參

去蘆頭

知母

各半兩

釣藤

川升麻

葛根 子苓

犀角

射干

各一分

玄參

二分

右細羅為散五歲以竹瀝半合調半錢服日三服量

兒大小加減服若未辨合煎藥可服玄參生犀升麻

葛根竹瀝生薑汁大豆汁地黃汁皆可單服又取少

蚯蚓糞水調服良

釣藤散 治小兒壯熱欲發癰或時四肢抽掣多吐白

沫宜服之

釣藤

甘草

炙赤剉

川升麻

石膏

各半兩

人參

去蘆頭

子苓

犀角

屑

蚱蟬

三枚微炙

川大黃

剉碎

微炒各一分

右麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去渣入竹瀝半合牛黃末一字看小兒大小分減服之

茯神散 治小兒心腹結實身體壯熱四肢不利心神

多驚欲發癇

茯神 玄參

各一兩半

川升麻

秦艽

去苗

龍膽

去蘆

頭各一兩

寒水石

三兩

川大黃

剉研微炒

川芒硝

各三兩

右麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去渣分溫二服早晨午後各一服更量兒大小加減

龍齒散

治小兒壯熱欲發癇心驚神悸多啼或口吐

白沫

龍齒

川芒硝

各一兩

釣藤

川升麻

子苓

防風

去蘆頭

犀角

屑各三分

麥門冬

一兩去心焙

右麤羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉七片煎至五分去渣分為二服日四服量兒大小加減

安神散

一名安神湯

截癰安神除熱

白茯苓

二兩

石菖蒲

一寸九節

白鮮皮

人參

去蘆頭

遠志

各一兩

石膏

半兩

犀角

甘草

炙各半兩

右為麤末每服一錢水一盞入麥門冬少許煎至五分去滓放溫服時與服

退熱清涼散 治小兒壯熱欲發癰宜服

白藥子

甘草

炙微赤剉

鬱金

黃芩

天竺黃

細研

各一分

麝香

半分細研

硃砂

半兩細研水飛過

右細羅為散都研令勻不計時溫水調下半錢量兒大小加減

牛黃丸 治小兒驚熱入心擬成癰疾面色不定啼哭

不出發熱作時不喫乳食大便秘澀眼翻露白手足

逆冷

牛黃

研細

川大黃

剉細
微炒

獨活

各一
分

川升麻

琥珀

萊豆粉

大麻仁

各半
兩

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子不計時候以熟水研

一丸服之至五七歲金銀箔各五片藥兩丸研化下

獨活散 祛風截癰

獨活

羌活

川升麻

剉細

酸棗仁

揀
淨

人參

去
蘆

頭已上
各一兩

川大黃

細剉微炒
各半兩

右為細末每服一錢水一小盞入金銀薄荷各少許

煎至五分去渣放溫服不拘時候

定心膏 安神治欲發癰

竹瀝

半合依
法旋取

大麻仁

研一分

生葛根

取汁合許
如無生者

只用乾葛剉細水浸
一宿慢火熬取汁

已上三味同研次入

硃

砂

半合依
法旋取

牛黃

麝香

各一錢

紫豆粉

一兩已
上並研

勻

右與石臼中搗二三百下成膏如鷄頭大每服一粒
至二粒煎人參湯下

清涼丹 治壯熱連滯欲作癰

鬱金 黃芩 犀角

未各一分

白芍藥

半兩

已上搗

羅為細末次用

腦麝

各研一錢

天竺黃

一分細研

好

硃砂

半兩細研水飛

右拌勻煉蜜和如鷄頭大每服一粒至二粒煎人參湯化下

知母散 治心熱弄舌欲作癰

知母

一兩

釣藤

升麻

葛根

剉

黃芩

各一分

藍葉

人參

去蘆頭
各半兩

右為細末每一錢水八分入竹瀝三兩點同煎至五
分去滓放溫服

地黃汁湯 治少小始滿月變蒸時患驚欲作癇已服
四味湯及紫圓已大下熱猶不折腹滿眼目視高者
宜此除熱

地黃

升半
合

黃芩

三分

大黃

甘草

炙各
一分

梔子

仁

二分

右切以水八合煮至四合去滓下地黃汁服一合日進三服夜一服

洗浴菖蒲湯 治散風截癰

菖蒲

三兩一十
九者節

防風

荊芥穗

各二兩

石膏

梅根

各一兩

右為麤末每用五匙頭水三碗煎三五沸適寒溫浴兒先頭面次浴身體為佳

救急中軍候黑丸 療諸癰結痰飲等大良及治小兒

欲發癰

杏仁

去皮尖五分
兩仁者熬

桔梗

桂心

各四分

巴豆

分八

去心
皮熬

芫花

十二分
分熬

右先搗桂心桔梗芫花成末別搗巴豆杏仁如膏合和又搗一千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆大漿水服一九取利可至二三九兒生十日欲癰發可與一二九如黍米大諸腹不快體中覺患便服之得一兩行利即好忌猪肉生葱蘆笋等物不拘時服

雞腦丸 治少小癰候夜啼不止

雄雞腦

丹砂

各二分

牛黃

當歸

各一分

右為末以雞腦和杵七百下丸麻子大百日兒服一丸日二服量大小加減

茯苓湯 治七日兒生後有熱欲作癰

茯苓

黃芩

釣藤

大黃

各一分

右切以水一升煮三合為三服或五服日多者加黃芩一分生三七以後者加大黃一分量兒大小加減

生薑子 治小兒欲發癰極熱不已

生葛根

汁

竹瀝

各一分

牛黃

如杏仁大細研

右相和每服半合量兒大小加減服

洗浴石膏湯 治小兒欲發癰壯熱如火

石膏

五兩

菖蒲

二兩

雷丸

三兩

右搗碎以水煮取三升適寒溫浴兒并洗頭面佳

雀屎丸 治少小癰候胎寒古下唾聚夜啼不止

雄雀屎

炒


麝香

牛黃

研入各一分

右為末蜜丸黍米大一月兒與一九日一服時極送藥看咽中吃乳食令即咽喉不久停口中而散也後稍加之百日兒麻子大一九日三臨服旋丸勿先丸下四十日而後牛黃麝香可加使多也為是一歲兒也

五苓散 治小兒因吐利欲作癰宜服方見傷寒門傷寒類



普濟方卷三百七十八